

### К оценке поперечников классов гладких функций в пространстве $L_q$

Получены точные по порядку оценки поперечников классов бесконечно дифференцируемых функций.

Одержані точні по порядку оцінки поперечників класів нескінченно диференційованих функцій.

Обозначим через  $W_D^k$  класс функций  $f$ , представимых в виде свертки

$$f(\cdot) = \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} K(\cdot - \tau) \varphi(\tau) d\tau, \quad \|\varphi\|_p \leq 1,$$

где  $s[K(\tau)] = \sum_{k=1}^{\infty} \psi(k) \cos(k\tau - \beta\pi/2)$ . Рассмотрим случай, когда  $\psi(k) = e^{-\alpha k^r}$ ,  $\alpha > 0$ ,  $r > 0$ .

Пусть  $X$  — банахово пространство,  $C$  — центральносимметричный компакт в  $X$ ,  $L_n$  — подпространство размерности  $n$ . Величину  $d_n(C, X) = \inf_{L_n \subset X} \sup_{u \in C} \inf_{v \in L_n} \|u - v\|_X$  называют колмогоровским поперечником множества  $C$  в  $X$  (см. например, [1]).

В [2] показано, что

$$d_{2n-1}(W_D^k, L_q) \stackrel{\text{df}}{=} d_{2n-1}(\psi, \beta, p, q) \ll \begin{cases} e^{-\alpha n^r n^{(1-r)+(1/p-1/q)}}, & 1 \leq p \leq q \leq 2, \\ 1 \leq q < p < \infty, & 2 \leq p < q < \infty, \\ e^{-\alpha n^r n^{(1-r)+(1/p-1/2)}}, & 1 < p \leq 2 < q < \infty. \end{cases} \quad (1)$$

В настоящей статье на базе метода, примененного в [3], получены оценки снизу поперечников классов  $W_D^k$ . Метод оценки снизу поперечников основывается на исследовании категорных поперечников  $\chi_N(\psi, \beta, p, q)$ ,

введенных В. М. Тихомировым. При этом, используя, по существу, одну и ту же конструкцию, удается получить окончательные в смысле порядка оценки на классах целых, аналитических, бесконечнодифференцируемых функций, а также на классах функций конечной гладкости при различных соотношениях между  $p$  и  $q$ . На первом этапе рассматривается след множества  $W_p^K$  на подпространстве  $\mathcal{F}_{2n+1} : W_p^K \cap \mathcal{F}_{2n+1} \stackrel{df}{=} W_{p,n}^K$ . Затем выпуклое тело  $W_{p,n}^K$  приближается многогранником  $Q_n(K, p) = \text{conv} \{t_n^{(1)}, \dots, t_n^{(m)}\}$ , где  $t_n^{(1)}, \dots, t_n^{(m)}$  — полиномы специального вида,  $t_n^{(k)} \in W_{p,n}^K$ ,  $1 \leq k \leq m$ . Очевидно,  $W_{p,n}^K \supset Q_n(K, p)$ . Далее, исследуем величину  $\eta_n = \inf \{F(\pi), \pi \in \mathbf{P}(\mathcal{F}_{2n+1})\}$ , где  $F(\pi) = \sup \{\|x\|, x \in Q(K, p) \cap \pi\}$ ,  $\pi$  — прямая проективного пространства  $\mathbf{P}(\mathcal{F}_{2n+1})$ . В ряде случаев (например, когда  $\psi(k) = e^{-\alpha k^r}$ ,  $\alpha > 0$ ,  $r \geq 1$ ) величина  $\eta_n$  дает точную по порядку оценку снизу для поперечника  $\gamma_{2n}(\psi, \beta, p, q)$ . На втором этапе, с учетом известных оценок для полиномов Рудина — Шапиро  $\left\| \sum_{k=1}^n r_k(\theta) e^{ikt} \right\|_{\infty} \leq Cn^{1/2}$ , где

$\theta \in [0, 1]$ , а  $r_k(\cdot)$  — функции Радемахера, либо неравенства Хинчина

$$\left( \int_0^1 \left| \sum_{k=1}^n c_k r_k(\theta) \right|^p d\theta \right)^{1/p} \leq (p/2 + 1) \sum_{k=1}^n c_k^2)^{1/2}, \quad p > 0,$$

строится случайное множество  $\sigma_n \in \mathbf{P}(\mathcal{F}_{2n+1})$ , имеющее достаточно высокую (в смысле Люстерника — Шнирельмана) категорию относительно  $\mathbf{P}(\mathcal{F}_{2n+1})$  такое, что величина  $\eta(\sigma_n) = \inf \{F(\pi), \pi \in \sigma_n\}$ , реализует соответствующую оценку снизу для поперечника  $\gamma_{2n}(\psi, \beta, p, q)$ . В ряде случаев величина  $\eta(\sigma_n)$  по порядку больше, чем  $\eta_n$  и реализует точную по порядку оценку снизу для поперечника.

**Теорема 1.** Пусть  $\alpha > 0$ ,  $r > 0$ ,  $\beta \in \mathbf{R}$ ,  $\psi_1(k) = e^{-\alpha k^r}$ , тогда

$$d_{2n}(\psi_1, \beta, p, q) \geq \gamma_{2n}(\psi_1, \beta, p, q) \gg$$

$$\gg \begin{cases} e^{-\alpha n^r}, & 1 \leq p \leq q \leq \infty, \quad 2 \leq q \leq p \leq \infty; \\ e^{-\alpha n^r n^{(1-r)+(1/p-1/q)}}, & 1 \leq p \leq q \leq 2; \\ e^{-\alpha n^r n^{(1-r)+(1/p-1/2)}}, & 1 \leq p \leq 2 < q \leq \infty. \end{cases}$$

Из теоремы 1 и оценок (1) находим

$$d_{2n}(\psi_1, \beta, p, q) \asymp \gamma_{2n}(\psi_1, \beta, p, q) \asymp$$

$$\asymp \begin{cases} e^{-\alpha n^r}, & 1 \leq p = q \leq \infty, \quad 2 \leq q \leq p \leq \infty, \\ & 2 \leq p \leq q < \infty; \\ e^{-\alpha n^r n^{(1-r)+(1/p-1/2)}}, & 1 \leq p \leq 2 < q < \infty, \\ e^{-\alpha n^r n^{(1-r)+(1/p-1/q)}}, & 1 \leq p \leq q \leq 2. \end{cases}$$

В связи с теоремой 1 отметим, что В. Н. Темляков сообщил автору другой способ доказательства оценок снизу для поперечников  $d_{2n}(\psi_1, \beta, p, q)$  при  $2 \leq q \leq p \leq \infty$ ,  $1 \leq p \leq q \leq 2$ ,  $1 \leq p \leq 2 < q \leq \infty$ .

1. Тихомиров В. М. Некоторые вопросы теории приближений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 304 с.
2. Кушпель А. К. Поперечники классов гладких функций в пространстве  $L_q$ . — Киев, 1987. — 54 с. — (Препринт/АН УССР. Ин-т математики; 87.44).
3. Кушпель А. К. Поперечники классов аналитических функций // Укр. мат. журн. — 1989. — 41, № 4. — С. 576—579.

Ин-т математики АН УССР, Киев

Получено 23.11.89