

ПРО НАЙКРАЩІ m -ЧЛЕННІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ТА ОРТОГОНАЛЬНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ КЛАСІВ $L_{\beta, p}^{\Psi}$

We obtain estimates exact in order for the best trigonometric and orthogonal-trigonometric approximations of classes of $L_{\beta, p}^{\Psi}$ -functions of one variable in the space L_q in the case where $2 < p \leq q < \infty$.

Одержано точні за порядком оцінки найкращих тригонометричних та ортогональних тригонометричних наближень класів $L_{\beta, p}^{\Psi}$ функцій однієї змінної в просторі L_q у випадку $2 < p \leq q < \infty$.

В цій роботі продовжується дослідження (розпочате в [1, 2]) поведінки величин

$$e_m(F, L_q) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{f \in F} \inf_{\Theta_m} \inf_{P(\Theta_m; x)} \|f - P(\Theta_m; x)\|_q, \quad (1)$$

де F — деякий функціональний клас, $P(\Theta_m; x)$ — поліноми вигляду $\sum_{k=1}^m a_k e^{in_k x}$, Θ_m — набір із m цілих чисел n_1, \dots, n_m , a_k — довільні коефіцієнти, L_q — простір 2π -періодичних функцій $f(x)$ із скінченною нормою

$$\|f(x)\|_q = \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}, \quad 1 \leq q < \infty,$$

на класах $L_{\beta, p}^{\Psi}$. Зокрема, в [2] було доведено таку теорему.

Теорема 1. Нехай $1 < p \leq 2 < q < \infty$, $\psi \in D$ і, крім того, існує $\varepsilon > 0$ таке, що послідовність $\psi(k)k^{1/p+\varepsilon}$ не зростає, $\beta \in R$. Тоді має місце співвідношення

$$e_m(L_{\beta, p}^{\Psi}; L_q) \asymp \psi(m)m^{1/p-1/2}.$$

Зокрема, D — множина незростаючих послідовностей $\psi(k)$ таких, що для будь-якого $k \in N$ $\psi(k) > 0$ і $\psi(k)/\psi(2k) \leq C$. Ми дотримуємося позначень, прийятих в [2]. Зазначимо також, що там же наведено бібліографію, що пов'язана з даною тематикою.

Теорема 2. Нехай $2 < p \leq q < \infty$, $\psi \in D$ і, крім того, існує $\varepsilon > 0$ таке, що послідовність $\psi(k)k^{1/2+\varepsilon}$ не зростає, $\beta \in R$. Тоді має місце співвідношення

$$e_m(L_{\beta, p}^{\Psi}; L_q) \asymp \psi(m).$$

Доведення. Оцінка зверху впливає із теореми 1 при $p = 2$, згідно з вкладенням $L_{\beta, p}^{\Psi} \subseteq L_{\beta, 2}^{\Psi}$, оскільки у цьому випадку

$$e_m(L_{\beta, p}^{\Psi}; L_q) \gg e_m(L_{\beta, 2}^{\Psi}; L_q) \asymp \psi(m), \quad p \geq 2.$$

Встановимо оцінку знизу. Для цього нам знадобиться результат Рудіна-Шапіро (див., наприклад, [3, с. 155]). Сформулюємо його.

Лема. Для кожного $s \in N$ знайдеться поліном

$$R_s(x) = \sum_{k=2^{s-1}}^{2^s-1} \varepsilon_k e^{ikx}, \quad \varepsilon = \pm 1,$$

такий, що

$$\|R_s(x)\|_\infty \ll 2^{s/2}.$$

Продовжимо доведення теореми. Воно буде базуватися на використанні співвідношення двоїстості (див., наприклад, [4, с. 42]): для $f \in L_q(-\pi; \pi)$

$$e_m(f, L_q) = \inf_{\Theta_m} \inf_{P \in \Theta_m; x} \|f(x) - P(\Theta_m; x)\|_q = \inf_{\Theta_m} \sup_{P \in L^1(\Theta_m) - \pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) P(x) dx, \\ \|P\|_{q'} \leq 1$$

де $L^1(\Theta_m)$ — множина функцій, які ортогональні підпростору тригонометричних поліномів з „номерама” гармонік із множини Θ_m , а $\frac{1}{q} + \frac{1}{q'} = 1$.

Виберемо l таким чином, щоб було $2m \leq 2^l < 3m$, і розглянемо функцію

$$f(x) = \frac{1}{2^{l/2}} \psi(2^l) f_1(x), \quad (2)$$

де $f_1(x) = \sum_{s \leq l} R_s(x)$, а $R_s(x)$ — поліном Рудіна–Шапіро.

Покажемо, що існує стала C_1 така, що $f^*(x) = C_1^{-1} f(x) \in L_{\beta, p}^\Psi$. Для цього достатньо пересвідчитися, що $\|f_{\beta}^\Psi(x)\|_p \leq C_1$. Згідно з [5], для $f_1(x)$ маємо

$$\|(f_1)_{\beta}^\Psi(x)\|_p \ll \psi^{-1}(2^l) \|f_1(x)\|_p, \quad 1 < p < \infty. \quad (3)$$

Внаслідок леми

$$\|(f_1)_{\beta}^\Psi(x)\|_p \ll \psi^{-1}(2^l) 2^{\frac{l}{2}}. \quad (4)$$

Співставляючи (2) – (4), одержуємо

$$\|f_{\beta}^\Psi(x)\|_p \ll \psi^{-1}(2^l) 2^{\frac{l}{2}} 2^{\frac{-1}{2}} \psi(2^l),$$

що доводить належність функції $f^*(x) = C_1^{-1} f(x)$ до класу $L_{\beta, p}^\Psi$.

Нехай далі $u(x) = \sum_{s \leq l}' R_s(x)$ — функція, що містить тільки ті гармоніки функції $f_1(x)$, які мають номери із множини Θ_m .

Покладемо $P_1(x) = f_1(x) - u(x)$ і оцінимо $\|P_1(x)\|_{q'}$. Оскільки $q' \leq 2$, то, враховуючи лему, маємо

$$\|P_1(x)\|_{q'} \ll \|f_1(x)\|_{q'} + \|u_1(x)\|_2 \ll 2^{\frac{l}{2}} + m^{\frac{1}{2}} \ll m^{\frac{1}{2}}.$$

Очевидно, що поліном $P(x) = m^{-1/2} P_1(x)$ задовольняє вимоги правої частини рівності (3). Підставляючи побудовані функції $f^*(x)$ і $P(x)$ в (3) і враховуючи вибір l , одержуємо оцінку

$$e_m(L_{\beta, p}^\Psi; L_q) \gg 2^{\frac{l}{2}} \psi(2^l) m^{\frac{1}{2}} (2^l - m) \gg 2^{\frac{l}{2}} \psi(2^l) m^{\frac{1}{2}} 2^l \gg \psi(m),$$

яка і доводить теорему.

Найкращим ортогональним тригонометричним наближенням функцій класу $L_{\beta,p}^{\Psi}$ в метриці простору L_q називають величину

$$e_m^{\perp}(L_{\beta,p}^{\Psi}; L_q) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{f \in L_{\beta,p}^{\Psi}} \inf_{\Theta_m} \|f(x) - S(\Theta_m; x)\|_q,$$

де $S(\Theta_m; x) = \sum_{k=1}^m c_k e^{inkx}$, c_k — коефіцієнти Фур'є функції $f(x)$.

Теорема 3. Нехай $2 < p \leq q < \infty$, $\psi \in D$ і, крім того, послідовність $\psi(k)k^{1/p-1/q}$ не зростає, $\beta \in R$. Тоді справедливе співвідношення

$$e_m^{\perp}(L_{\beta,p}^{\Psi}; L_q) \asymp \psi(m)m^{1/p-1/q}.$$

Доведення. Оцінка зверху випливає із наближення сумами Фур'є (див. [6, с. 215]) та оцінки $e_m^{\perp}(L_{\beta,p}^{\Psi}; L_q) \ll \mathcal{E}_m(L_{\beta,p}^{\Psi}; L_q)$.

Встановимо оцінку знизу. Будемо користуватися відомим співвідношенням (див., наприклад, [4, с. 392])

$$\|f\|_q = \sup_{\|g\|_{q'} \leq 1} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx \right|, \quad f \in L_p[-\pi; \pi], \quad 1 \leq p \leq \infty, \quad 1/p + 1/p' = 1,$$

згідно з яким для $\|f(x) - S_m(f; x)\|_q$ одержимо

$$\|f(x) - S_m(f; x)\|_q = \sup_{\|g\|_{q'} \leq 1} \left| \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_m(f; x))g(x)dx \right|. \quad (5)$$

За заданим m виберемо l із умови $2m < 2^l \leq 3m$ і розглянемо функцію $f_1(x) = \sum_{s \leq l} \sum_{k \in p(s)} e^{ikx}$. На підставі [5, с. 94] і оцінки з роботи [6, с. 214] маємо $\|(f_1)_{\beta}^{\Psi}(x)\|_p \ll \psi^{-1}(2^l) \|f_1(x)\|_p \asymp \psi^{-1}(2^l) 2^{l(1-1/p)}$, $1 < p < \infty$, що доводить належність функції $f(x) = C_1^{-1} 2^{-l(1-1/p)} \psi(2^l) f_1(x)$ до класу $L_{\beta,p}^{\Psi}$.

За $g(x)$ візьмемо поліном $g(x) = C_2^{-1} 2^{-l/q} f_1(x)$. Зазначимо, що $q' \in (1, 2)$. Використовуючи теорему Літлвуда–Пелі (див., наприклад, [2, с. 358]), нерівність $|a + b|^{\alpha} \leq |a|^{\alpha} + |b|^{\alpha}$, $0 \leq \alpha < 1$, маємо $\|f_1\|_{q'} \ll 2^{l/q}$, звідки випливає, що вибраний нами поліном $g(x)$ задовольняє умову правої частини рівності (5). Підставляючи вибрані нами $f(x)$ і $g(x)$ в (5), одержуємо оцінку знизу. Теорему доведено.

1. Ромашук А. С. Неравенства типа Бора–Фавара и наилучшие M -членные приближения классов $L_{\beta,p}^{\Psi}$ // Некоторые вопросы теории приближения функций и их приложения. – Киев: Ин-т математики АН УССР, 1988. – С. 98–108.
2. Федоренко А. С. Наилучшие m -членные тригонометрические приближения функций классов $L_{\beta,p}^{\Psi}$ // Ряды Фур'є: теория і застосування. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1998. – С. 356–364.
3. Кашиш Б. С., Саакян А. А. Тригонометрические ряды. – М.: Наука, 1984. – 495 с.
4. Корнейчук Н. П. Точные константы в теории приближения. – М.: Наука, 1987. – 424 с.
5. Ромашук А. С. Неравенства для L_p -норм $(\psi \beta)$ -производных и поперечники по Колмогорову классов функций многих переменных $L_{\beta,p}^{\Psi}$ // Исследования по теории аппроксимации функций. – Киев: Ин-т математики АН УССР, 1987. – С. 92–105.
6. Степанец А. И. Классификация и приближение периодических функций. – Киев: Наук. думка, 1987. – 286 с.