

ПРО ОДНУ АСИМПТОТИЧНУ РІВНІСТЬ РЕВЕРСА

We clarify an asymptotic equality proved by Revers for an interpolation analog of the classic Bernstein – Varga – Carpenter result.

Уточнено асимптотичну рівність, доведену Реверсом для інтерполяційного аналога класичного результату Bernstein – Varga – Carpenter.

1. Вступ і основний результат. Нехай P_{2n} – поліном Лагранжа, який інтерполює функцію $|x|^\alpha$, $\alpha > 0$, в нулях полінома Чебишова T_{2n+1} . Реверс [1] отримав інтерполяційний аналог класичного результату Bernstein – Varga – Carpenter. Він довів, що

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n)^\alpha \| |x|^\alpha - P_{2n} \|_{C[-1,1]} = \frac{2}{\pi} \left| \sin \frac{\pi\alpha}{2} \right| \sup_{x \in [0, \infty)} H(\alpha, x), \quad (1)$$

де

$$H(\alpha, x) := \int_0^\infty \frac{t^\alpha}{\sinh(t)} \frac{x |\sin x|}{x^2 + t^2} dt, \quad \alpha > 0, \quad x > 0.$$

Крім того, Реверс [2] знайшов асимптотично точний вираз для правої частини (1). А саме, довів таку теорему.

Теорема 1 ([2], теорема 1.3). *Справджується асимптотична рівність*

$$\|H(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} = \frac{1}{1 + 2\alpha} C(\alpha)(1 + o(1)), \quad \alpha \rightarrow \infty,$$

де

$$C(\alpha) := \int_0^\infty \frac{t^\alpha}{\sinh(t)} dt, \quad \alpha > 0.$$

З цією метою він, зокрема, довів таке твердження.


Теорема 2 ([2], теорема 3.1). *Нехай $\alpha \geq 2$. Тоді має місце*

$$\frac{C(\alpha)}{1 + 2\alpha} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right) \leq H_1(\alpha, \alpha) \leq \|H_1(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} = \frac{C(\alpha)}{1 + 2\alpha} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{\alpha}}\right),$$

де

$$H_1(\alpha, x) := \int_0^\infty \frac{t^\alpha}{\sinh(t)} \frac{x}{x^2 + t^2} dt, \quad \alpha > 0, \quad x > 0.$$

Спрощуючи доведення з [2], встановимо точніші оцінки. Основним результатом цієї роботи є така теорема.



Графіки $\alpha \left(1 - \frac{2H(\alpha, \pi/2)}{C(\alpha-1)}\right)$ (а) та $\alpha \left(1 - \frac{2H(\alpha, 3\pi/2)}{C(\alpha-1)}\right)$ (б) на відповідних проміжках.

Теорема 3. Нехай $\alpha \geq 2$. Тоді має місце

$$(1 - 1/\alpha)C(\alpha - 1) \leq 2\|H(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} \leq 2\|H_1(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} \leq C(\alpha - 1). \quad (2)$$

Зауважимо, що нерівність $\|H(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} \leq \|H_1(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)}$ є очевидною, а оцінка $2\|H_1(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} \leq C(\alpha - 1)$ легко випливає з нерівності $x^2 + t^2 \geq 2xt$ (детальніше див. [2], лема 3.7). Отже, щоб отримати (2), нам потрібно довести лише його ліву частину.

Безпосередніми обчисленнями отримуємо

$$\alpha \left(1 - \frac{2H(\alpha, \pi/2)}{C(\alpha-1)}\right) < 0,7 < 1, \quad 2 \leq \alpha \leq \pi,$$

і

$$\alpha \left(1 - \frac{2H(\alpha, 3\pi/2)}{C(\alpha-1)}\right) < 0,7 < 1, \quad \pi < \alpha \leq 2\pi,$$

що зумовлює справедливість лівої частини (2) для $2 \leq \alpha \leq 2\pi$ (див. рисунок).

Таким чином, залишилося довести лему 1.

Лема 1. Нехай $\alpha > 2\pi$. Тоді

$$C(\alpha - 1) - 2\|H(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} \leq \frac{1}{\alpha}C(\alpha - 1). \quad (3)$$

2. Доведення леми 1. Нехай

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{e^t} dt$$

— гамма-функція Ейлера.

Лема 2. Нехай $\alpha > 1$. Тоді

$$\Gamma(\alpha) - H_1(\alpha, x) \leq \frac{x}{2\alpha(\alpha-1)}\Gamma(\alpha) + \frac{(x-\alpha)^2}{2x\alpha}\Gamma(\alpha).$$

Доведення. Маємо

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha) - H_1(\alpha, x) &\leq \int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{e^t} dt - 2 \int_0^\infty \frac{t^\alpha}{e^t} \frac{x}{x^2 + t^2} dt = \\ &= \int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{e^t} \frac{(x-t)^2}{x^2 + t^2} dt \leq \int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{e^t} \frac{(x-t)^2}{2xt} dt = \\ &= \frac{1}{2x} (x^2 \Gamma(\alpha - 1) - 2x \Gamma(\alpha) + \Gamma(\alpha + 1)) = \\ &= \frac{1}{2x} \left(\frac{x^2}{\alpha - 1} \Gamma(\alpha) - 2x \Gamma(\alpha) + \alpha \Gamma(\alpha) \right) = \\ &= \frac{\Gamma(\alpha)}{2x\alpha} \left(\frac{x^2}{\alpha - 1} + x^2 - 2x\alpha + \alpha^2 \right) = \\ &= \frac{x}{2\alpha(\alpha - 1)} \Gamma(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{2x\alpha} \Gamma(\alpha). \end{aligned}$$

Лема 3. Нехай $\alpha > 2\pi$. Тоді

$$\Gamma(\alpha) - \|H(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} < \frac{0,91}{\alpha} \Gamma(\alpha).$$

Доведення. Нехай $x(\alpha)$ — така точка, що $|\alpha - x(\alpha)| \leq \pi/2$ і $|\sin x(\alpha)| = 1$. Тоді

$$H_1(\alpha, x(\alpha)) = H(\alpha, x(\alpha)) \leq \|H(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)}.$$

Звідси за лемою 2

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha) - \|H(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} &\leq \Gamma(\alpha) - H_1(\alpha, x(\alpha)) \leq \\ &\leq \frac{\Gamma(\alpha)}{\alpha} \left(\frac{x(\alpha)}{2(\alpha - 1)} + \frac{(x(\alpha) - \alpha)^2}{2x(\alpha)} \right) \leq \frac{\Gamma(\alpha)}{\alpha} \left(\frac{x(\alpha)}{2(\alpha - 1)} + \frac{\pi^2}{8x(\alpha)} \right) \leq \\ &\leq \frac{\Gamma(\alpha)}{\alpha} \left(\frac{5\pi}{4(2\pi - 1)} + \frac{\pi^2}{20\pi} \right) < \frac{\Gamma(\alpha)}{\alpha} \left(\frac{3}{4} + \frac{\pi}{20} \right) < 0,91 \frac{\Gamma(\alpha)}{\alpha}. \end{aligned}$$

Лема 4. Нехай $\alpha > 1$. Тоді

$$\frac{1}{2} C(\alpha - 1) = \Gamma(\alpha) \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{(2k + 1)^\alpha}.$$

Доведення. Оскільки

$$\frac{1}{u - 1/u} = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{u^{2k+1}}, \quad u > 1,$$

і

$$\int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{e^{mt}} dt = \frac{\Gamma(\alpha)}{m^\alpha}, \quad m > 0,$$

то отримуємо

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}C(\alpha - 1) &= \int_0^{\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{e^t - e^{-t}} dt = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{e^{(2k+1)t}} dt = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} \frac{1}{e^{(2k+1)t}} dt = \Gamma(\alpha) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^\alpha}. \end{aligned}$$

Наслідок. Нехай $\alpha \geq 2$. Тоді

$$\frac{1}{2}C(\alpha - 1) = \Gamma(\alpha) \left(1 + \frac{\theta(\alpha)}{3^\alpha} \right),$$

де

$$1 < \theta(\alpha) < 2,11.$$

Справді, за лемою 4

$$\begin{aligned} 1 < \theta(\alpha) &= 3^\alpha \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^\alpha} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^\alpha}{(2k+1)^\alpha} \leq \theta(2) = \\ &= 9 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = 9 \left(\frac{\pi^2}{8} - 1 \right) = 2,103 \dots \end{aligned}$$

Доведення нерівності (3). Використовуючи лему 3 і наслідок, отримуємо

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}C(\alpha - 1) - \|H(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} &= \frac{1}{2}C(\alpha - 1) - \Gamma(\alpha) + \Gamma(\alpha) - \|H(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} \leq \\ &\leq \frac{\theta(\alpha)}{3^\alpha} \Gamma(\alpha) + \frac{0,91}{\alpha} \Gamma(\alpha) \leq \frac{1}{\alpha} \frac{2\pi \cdot 2,11}{3^{2\pi}} \Gamma(\alpha) + \frac{0,91}{\alpha} \Gamma(\alpha) \\ &< \frac{\Gamma(\alpha)}{\alpha} < \frac{1}{2} \frac{C(\alpha - 1)}{\alpha}. \end{aligned}$$

Зауваження. З леми 2, теореми 3 і наслідку випливає, що

$$\Gamma(\alpha) \left(1 - \frac{1}{2(\alpha - 1)} \right) \leq H_1(\alpha, \alpha) \leq \|H_1(\alpha, \cdot)\|_{L_\infty[0, \infty)} \leq \Gamma(\alpha) \left(1 + \frac{2,1}{3^\alpha} \right), \quad \alpha \geq 2.$$

Література

1. M. Revers, *Extremal polynomials and entire functions of exponential type*, Res. Math., **2018**, № 73, Article 73:109 (2018).
2. M. Revers, *Asymptotics of polynomial interpolation and the Bernstein constants*, Res. Math., **2021**, № 76, Article 76:100 (2021).

Одержано 16.01.22