

Л. Е. Базилевич, канд. фіз.-мат. наук
(Ін-т прикл. проблем механіки і математики АН України, Львів)

Поповнені простори функцій на континуумах Пеано

Одержано опис топології пари $(\tilde{C}(\Pi, I), C(\Pi, I))$ для пеанівського континууму Π , де $\tilde{C}(\Pi, I)$ — замикання в гіперпросторі $\exp(\Pi \times I)$ образу простору неперервних функцій $C(\Pi, I)$ при природному вкладенні.

Получено описание топологии пары $(\tilde{C}(\Pi, I), C(\Pi, I))$ для пеановского континуума Π , где $\tilde{C}(\Pi, I)$ — замыкание в гиперпространстве $\exp(\Pi \times I)$ образа пространства непрерывных функций $C(\Pi, I)$ при естественном вложении.

Гіперпростір $\exp X = \{A \subset X | A \neq \emptyset\}$ — замкнена підмножина в X метричного компакта (X, d) метризується метрикою Гаусдорфа $d_H : d_H(A, B) = \inf \{e > 0 | A \subset O_e(B), B \subset O_e(A), A, B \in \exp X\}$. Нехай Π — метричний континуум Пеано, $I = [-1, 1]$ — сегмент. Розглянемо простір $C(\Pi, I)$ неперервних функцій $f : \Pi \rightarrow I$ з метрикою, індукованою відображенням $\Gamma : C(\Pi, I) \rightarrow \exp(\Pi \times I)$, яке кожній функції $f \in C(\Pi, I)$ ставить у відповідність її графік $\Gamma(f) = \{(x, y) \in \Pi \times I | y = f(x)\} \in \exp(\Pi \times I)$ (тут ми вважаємо, що на Π задана фіксована опукла метрика d_Π [1] і на $\Pi \times I$ метрика задається формулою $d_{\Pi \times I}((q', t'), (q'', t'')) = ((d_\Pi(q', q''))^2 + (t' - t'')^2)^{1/2}$; надалі часто опускаються індекси у позначеннях для метрик). Позначимо через $\tilde{C}(\Pi, I)$ поповнення простору $C(\Pi, I)$ за вказаною метрикою. Метричні простори вигляду $C(\Pi, I)$ та $\tilde{C}(\Pi, I)$ розглядалися у працях [1—3]. Зокрема, В. В. Федорчук довів, що простір $\tilde{C}(\Pi, I)$ гомеоморфний гільбертовому кубу $Q = \prod_{i=1}^{\infty} [-1, 1]$ (цей результат фактично міститься в [3], хоча явно не сформульований).

Нагадаємо, що пісевдовнутрішністю гільбертового куба $Q = \prod_{i=1}^{\infty} [-1, 1]$ називається підмножина $s = \prod_{i=1}^{\infty} (-1, 1)_i \subset Q$. Топологічна характеристика пари (Q, s) наведена в [4]: пара (Q, A) гомеоморфна (Q, s) тоді і лише тоді, коли $Q \setminus A$ — Z -скелетоїд в Q . При цьому множина $B \subset Q$ називається Z -скелетоїдом, якщо $B = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$, де $K_1 \subset K_2 \subset \dots$ — така послідовність Z -множин в Q , що для кожної Z -множини $A \subset Q$, кожного $\varepsilon > 0$ і $i \in \mathbb{N}$ існує такий гомеоморфізм $h : Q \rightarrow Q$, що:

- 1) $h|(A \cap K_n) = \text{id}$;
- 2) $h(A) \subset K_m$ для деякого $m \geq n$;
- 3) $d(h, \text{id}_Q) < \varepsilon$

(замкнена підмножина $C \subset Q$ називається Z -множиною, якщо тодіожне відображення Q апроксимується відображеннями Q в $Q \setminus C$ [5]).

Основним результатом даної праці є наступне твердження, яке анонсоване в [6].

Теорема. Нехай Π — континуум Пеано, тоді пара $(\tilde{C}(\Pi, I), C(\Pi, I))$ гомеоморфна парі (Q, s) .

Доведення. Нам знадобляться деякі допоміжні твердження.

Лема 1. Для будь-якого $\varepsilon > 0$ і будь-якого компакту $M \subset C(\Pi, I)$, $\text{diam } M < \varepsilon$, M стягується в точку по підмножині діаметру $\langle 4\varepsilon \rangle$ в $C(\Pi, I)$.

Доведення. Нехай для кожного $f \in C(\Pi, I)$ і $\delta > 0$ $\sigma(f, \delta) = \max \{\xi > 0 \mid \text{для кожного } x \in \Pi \text{ і кожних } x', x'' \in Q_\xi(x) \text{ маємо } |f(x') - f(x'')| \leq \delta\}$. Легко бачити, що для фіксованого $f \not\equiv 0$ функція $\sigma(f, \delta)$ монотонно спадає до нуля при $\delta \rightarrow 0$.

Нехай $g, g_0 \in C(\delta, I)$ такі, що $d(g, g_0) = \delta > 0$, і $h = \min \{\sigma(g, \delta), \sigma(g_0, \delta)\}$. Нехай S_h — довільна h -сітка континууму Π і $h' = \min \{\sigma(g, h/3), h/3\}$. Побудуємо функцію $g_1 \in C(\Pi, I)$:

$$g_1(x) = \begin{cases} g(x) & \text{при } d(x, S_h) \geq h', \\ \frac{d(x, S_h)}{h'} g(x) + \left(1 - \frac{d(x, S_h)}{h'}\right) g_0(x) & \text{при } 0 \leq d(x, S_h) \leq h'. \end{cases}$$

Нехай $\gamma_1(t) = g + t(g_1 - g)$, $\gamma_2(t) = g_1 + t(g_0 - g_1)$, $t \in [0, 1]$ (використовується природна афінна структура в просторі $C(\Pi, I)$). Означимо відображення $\Gamma_{g, g_0} : [0, 1] \rightarrow C(\Pi, I)$ формулою

$$\Gamma_{g, g_0}(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t), & \text{якщо } t \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ \gamma_2(2t - 1), & \text{якщо } t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Неважко переконатись, що $\text{diam } \Gamma_{g, g_0}([0, 1]) < 4\delta$.

Нехай тепер $g \in M$ і $h = \inf \{\sigma(g, \varepsilon) \mid g \in M\}$. Оскільки M — компакт, то $h > 0$. Відображення $\Gamma_{g, g_0} : [0, 1] \rightarrow C(\Pi, I)$ будеться, як описано вище. Нарешті, відображення $\Gamma : M \times [0, 1] \rightarrow C(\Pi, I)$, $\Gamma(g, t) = \Gamma_{g, g_0}(t)$, $g \in M$, $t \in [0, 1]$ є шуканим стягуванням компакта M .

Наслідок. Кожен компакт $K \subset \tilde{C}(\Pi, I) \setminus C(\Pi, I)$ є Z -множиною в $\tilde{C}(\Pi, I)$.

Доведення полягає в нескладній модифікації стандартних міркувань [7].

Справді, візьмемо довільне $\varepsilon > 0$. Існує $n \in \mathbb{N}$ і ретракція $r : \tilde{C}(\Pi, I) \rightarrow K$ на n -вимірний поліедр $K \subset \tilde{C}(\Pi, I)$, $K \cong I^n$, $d(r, \text{id}) < \varepsilon/2$.

Нехай задана тріангуляція \mathcal{T} поліедра K така, що $\text{diam}(\sigma) < \frac{1}{3 \cdot 2^{n+1}}$ для кожного симплексу σ . Нехай x_0, \dots, x_k — вершини тріангуляції \mathcal{T} . Оскільки $C(\Pi, I)$ скрізь щільний у $\tilde{C}(\Pi, I)$, то існують $y_0, \dots, y_k \in C(\Pi, I)$ такі, що $d(x_i, y_i) < \frac{1}{3 \cdot 2^{n+1}}$. Тоді якщо x_i, x_j — вершини одновимірного симплексу в \mathcal{T} , то $d(y_i, y_j) < \frac{1}{2^{n+1}}$.

Покладемо $g(x_i) = y_i$. Індукцією по l означимо відображення $g : K^{(l)} \rightarrow C(\Pi, I)$ ($K^{(l)}$ — l -вимірний кістяк поліедра K). Нехай відображення g задане на $K^{(l-1)}$ і σ — l -вимірний симплекс. Тоді $g|_{\partial\sigma}$ задане і за лемою 1 можемо продовжити g на σ так, що $\text{diam}(g(\sigma)) < 4 \text{ diam}(g(\partial\sigma))$. Тоді $d(g, \text{id}) < \varepsilon/2$ і відображення $f = gr : \tilde{C}(\Pi, I) \rightarrow C(\Pi, I)$ є ε -сув.

Для $0 < \varepsilon < 1$ позначимо через $H_\varepsilon : \tilde{C}(\Pi, I) \rightarrow \tilde{C}(\Pi, I)$ відображення, що діє за формулою $H_\varepsilon(A) = \{(x, (1-\varepsilon)y) \mid (x, y) \in A\}$, $A \in \tilde{C}(\Pi, I)$.

Нехай $U_\varepsilon : \tilde{C}(\Pi, I) \rightarrow \tilde{C}(\Pi, I)$ — відображення, яке переводить кожен елемент $A \in \tilde{C}(\Pi, I)$ в його замкнений ε -окіл $U_\varepsilon(A) = \{(x, y) \in \Pi \times I \mid$

$d((x, y), A) \leq \varepsilon$. З опуклості метрики на $\Pi \times I$ випливає, що відображення U_ε неперервне [1].

Нехай $A \in \bar{C}(\Pi, I)$, $A \subset \Pi \times I \subset \Pi \times \mathbb{R}$. Легко бачити, що $(\Pi \times \mathbb{R}) \setminus A = V_1 \cup V_2$, де V_1, V_2 — компоненти зв'язності множини $(\Pi \times \mathbb{R}) \setminus A$. Припускаємо, що $\Pi \times \{2\} \subset V_1$. Нехай $B(A) = \text{Bd}_{\Pi \times \mathbb{R}}(A) \cap \text{Bd}_{\Pi \times \mathbb{R}}(V_1)$, $B'(A) = \text{Bd}_{\Pi \times \mathbb{R}}(A) \cap \text{Bd}_{\Pi \times \mathbb{R}}(V_2)$. Зрозуміло, що $B(A), B'(A) \in \bar{C}(\Pi, I)$.

Будемо говорити, що $A \in \bar{C}(\Pi, I)$ задовільняє умову Ліпшиця з константою k над кулею $K \subset \Pi$, якщо k — мінімальне число, для якого виконується умова: для довільних $z', z'' \in A$, $z' = (x', y'), z'' = (x'', y'')$, $x', x'' \in \Pi \cap K$, $y', y'' \in I$, маємо $|y' - y''| < k |x' - x''|$. Якщо куля $K' \subset K \cap A$ задовільняє умову Ліпшиця з константою k над K , то A задовільняє умову Ліпшиця над K' з константою $k' \leq k$.

Означимо функцію $k_A : \Pi \rightarrow [0, +\infty]$, рівну в точці $x \in \Pi$ інфімуму всіх тих констант k , при яких A задовільняє умову Ліпшиця з константою k над деякою кулею $K \ni x$, і $k_A(x) = +\infty$, якщо таких констант k не існує.

Нехай $D_A := \{x \in \Pi \mid k_A(x) \leq \frac{1}{4}\}$.

Лема 2. Для всякого $\varepsilon > 0$ існує така куля K діаметра $< \varepsilon/10$, що $k_{B(U_{\varepsilon/2} H_\varepsilon(A))}(x) \leq \frac{1}{4}$ для $x \in K$.

Доведення. Нехай точка $z_0 = (x_0, y_0) \in H_\varepsilon(A)$ така, що для всіх інших точок $z' = (x', y') \in H_\varepsilon(A)$ виконується $y_0 \geq y'$. Покажемо, що над кулею $K = K(x_0, \varepsilon/20) = \{x \in \Pi \mid d(x, x_0) < \varepsilon/10\}$ множина $B(U_{\varepsilon/2} H_\varepsilon(A))$ задовільняє умову Ліпшиця з константою $k < \frac{1}{4}$.

Нехай $z' = (x', y')$, $z'' = (x'', y'') \in B(U_{\varepsilon/2} H_\varepsilon(A)) \cap K \times I$ — дві довільні точки. Припустимо, що $y' > y''$, і нехай $\alpha = \frac{y' - y''}{d(x', x'')}$.

Оскільки $z' \in B(U_{\varepsilon/2} H_\varepsilon(A))$, то існує t' така, що $d(t, z') = \varepsilon/2$. Легко бачити, що $t \in D \cap D'$, де $D = \{z \in \Pi \times I \mid d(z, z'') \geq d(z, z')\}$ і $D' = \{z = (x, y) \in \Pi \times I \mid y < y_0 - \varepsilon/2\}$. Тому має бути $d(z', D \cap D') < \varepsilon/2$. Оцінимо

$$d(z', D \cap D') = \inf \{ \sqrt{d_\Pi(x', x)^2 + (y' - y)^2} \mid z = (x, y) \in D \cap D' \} = \\ = \sqrt{ \inf \left\{ (d_\Pi(x, x'))^2 \mid z = \left(x, y_0 - \frac{\varepsilon}{2} \right) \in D \cap D' \right\} + \left(y' - y_0 + \frac{\varepsilon}{2} \right)^2 }.$$

Нехай $z \in D \cap D'$. Тоді

$$(d_\Pi(x, x''))^2 + (y_0 - y'' - \varepsilon/2)^2 \geq (d_\Pi(x, x'))^2 + (y_0 - y' - \varepsilon/2)^2, \\ (d_\Pi(x, x''))^2 - (d_\Pi(x, x'))^2 \geq (y' - y'') (\varepsilon - (2y_0 - y' - y'')). \quad (1)$$

Припустимо, що $(x', t_0) \in D \cap D'$. Тоді $d(z', D \cap D') = y' - t_0 < \varepsilon/2$ і звідси одержуємо

$$(d_\Pi(x', x''))^2 \geq (y' - y'') (\varepsilon - (2y_0 - y' - y'')) = \alpha d_\Pi(x', x'') (\varepsilon - (2y_0 - y' - y'')), \quad (2)$$

$$\alpha \leq d_\Pi(x', x'') (\varepsilon - (2y_0 - y' - y''))^{-1}.$$

Нехай $(x', t_0) \notin D \cap D'$. Тоді $d_\Pi(x, x'') \leq d_\Pi(x'', x') + d_\Pi(x', x)$. Підставимо в (1)

$$d_\Pi(x', x) \geq \frac{(y' - y'') (\varepsilon - (2y_0 - y' - y'')) - (d_\Pi(x', x''))^2}{2d_\Pi(x', x'')}.$$

Оскільки $d(z, D \cap D') \leq \varepsilon/2$, то

$$\left(y' - y_0 + \frac{\varepsilon}{2} \right)^2 + \left(\frac{(y' - y'') (\varepsilon - (2y_0 - y' - y'')) - (d_\Pi(x', x''))^2}{2d_\Pi(x', x'')} \right)^2 \leq \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^2,$$

$$(y_0 - y')^2 - \varepsilon(y_0 - y') + \frac{1}{4}(\alpha(\varepsilon - (2y_0 - y' - y'') - d_{\Pi}(x', x''))^2 \leq 0, \quad (3)$$

$$\alpha \leq \frac{d_{\Pi}(x', x'') + 2\sqrt{(y_0 - y')(e - (y_0 - y'))}}{e - (2y_0 - y' - y'')}.$$

Оцінимо α . Оскільки $d_{\Pi}(x', x'') < \text{diam } K < \varepsilon/10$, $y_0 - y' \leq \frac{\varepsilon}{2}$ — $\sqrt{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2 - \left(\frac{\varepsilon}{20}\right)^2} = \frac{\varepsilon}{2}\left(1 - \frac{\sqrt{99}}{10}\right)$, то в обох випадках (2) і (3) маємо $\alpha \leq \frac{10}{\varepsilon \cdot \sqrt{99}} \sqrt{\frac{\varepsilon}{10} + 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2}\left(1 - \frac{\sqrt{99}}{10}\right) \cdot \frac{\varepsilon}{2}\left(1 + \frac{\sqrt{99}}{10}\right)} = \frac{2}{\sqrt{99}} < \frac{1}{4}$.

Лема доведена.

З леми 2 випливає що множина $D_{B(U_{\varepsilon/2}H_{\varepsilon}(A))}$ для довільного $A \in \tilde{C}(\Pi, I)$ містить кулю $K \subset \Pi$ діаметра $\geq \varepsilon/10$. Означимо функцію $\psi_{A,\varepsilon} \in C(\Pi, I)$ формулою

$$\psi_{A,\varepsilon}(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } d(x, \Pi \setminus D_{B(U_{\varepsilon/2}H_{\varepsilon}(A))}) \geq \frac{\varepsilon}{80}, \\ \frac{80}{\varepsilon} \cdot d(x, \Pi \setminus D_{B(U_{\varepsilon/2}H_{\varepsilon}(A))}) & \text{при } 0 < d(x, \Pi \setminus D_{B(U_{\varepsilon/2}H_{\varepsilon}(A))}) \leq \frac{\varepsilon}{80}, \\ 0 & \text{при } x \notin D_{B(U_{\varepsilon/2}H_{\varepsilon}(A))}. \end{cases}$$

Зафіксуємо довільне $\delta > 0$. Індукцією по i неважко побудувати множину $\{x_i \mid i \in \mathbb{N}\} \subset \Pi$ і таку послідовність натуральних чисел $N_0 \leq N_1 \leq N_2 \leq \dots$, що $x_m \neq x_n$, $m, n \in \mathbb{N}$, і для кожного $i = 0, 1, 2, \dots$ множина $S_i = \{x_1, \dots, x_{N_i}\} \in \delta/2^i$ -сіткою в Π .

Нехай $\sigma_i = \min \{d(x_m, x_n) \mid 1 \leq m \neq n \leq N_i\} \leq \delta/2^{i-1}$. Легко бачити, що $\sigma_i \rightarrow 0$ при $i \rightarrow \infty$. Візьмемо довільну строго монотонно зростаючу функцію $\sigma : [0, \delta] \rightarrow [0, 1]$ таку, що $\sigma\left(\frac{\delta}{2^{i-1}}\right) \leq \sigma_i$ при $i = 0, 1, 2, \dots$. Для кожного ε , $0 < \varepsilon \leq \delta$, означимо функцію $\theta_{\varepsilon} : \{x_i \mid i \in \mathbb{N}\} \rightarrow [0, 1]$ формулами

$$\theta_{\varepsilon}(x) = \begin{cases} 1 & \text{для } x \in S_0, \\ 0 & \text{при } \varepsilon \geq \frac{3\delta}{2^{i+1}}, \\ 3 - \frac{2^{i+1} \cdot \varepsilon}{\delta} & \text{при } \frac{\delta}{2^i} \leq \varepsilon \leq \frac{3\delta}{2^{i+1}}, \\ 1 & \text{при } \varepsilon \leq \frac{\delta}{2^i} \end{cases}$$

Для кожного $A \in \tilde{C}(\Pi, I)$ побудуємо допоміжну «генну» функцію $\Phi_{A,t} \in C(\Pi, I)$. Будемо розглядати простір $\tilde{C}(\Pi, I)$ як підпростір гільбертового куба $\{1\} \times \prod_{i=1}^{\infty} \left[0, \frac{1}{2^{i-1}}\right]$, отже кожному $A \in \tilde{C}(\Pi, I)$ відповідає при такому вкладенні послідовність $(x_A^i)_{i=0}^{\infty}$, де $x_A^0 = 1$ і $0 \leq x_A^i \leq \frac{1}{2^{i-1}}$ при $i \geq 1$. Функція $\Phi_{A,t}$ задається формулою

$$\Phi_{A,t}(q) = \begin{cases} 1 & \text{при } q \in S_{i_0}, \\ x_A^t & \text{при } d(q, S_{i_0}) = \frac{\sigma(t)}{4} \left(1 - \frac{1}{2^t}\right), \quad i \in \mathbb{N}, \text{ де } i_0 \text{ — таке, що} \\ & \delta/2^{i_0} \leq t < \delta/2^{i_0-1}. \end{cases}$$

Легко бачити, що функція $\Phi_{A,\delta}$ вибрана так, що знаючи її значення над довільною множиною $\Pi \cap K(x, r)$, $x \in \Pi$, $r \geq 2\delta$, можна відновити точку (x_A^t) , а отже, і $A \in \tilde{C}(\Pi, I)$.

Тепер задамо неперервне відображення $h_e : \tilde{C}(\Pi, I) \rightarrow \tilde{C}(\Pi, I)$ формулою $h_e(A) = \cup \left\{ \{x\} \left[y, y + \frac{\varepsilon}{4} \cdot \psi_{A,e}(x) \Phi_{A,e/40}(x) \theta_{e/40}(x) \right] \mid (x, y) \in U_{e/2} H_e(A) \right\}$.

Для довільного $A \in \tilde{C}(\Pi, I)$ нехай $\omega(A) = \max \{y > 0 \mid [(x, y_0), (x, y_0 + y)] \in A \text{ для деяких } x \in \Pi, y_0 \in [-1, 1-y]\}$. Зрозуміло, що $\omega(A) = 0$ тоді і лише тоді, коли $A \in C(\Pi, I)$. Нехай $\mathcal{A}(l) = \{A \in \tilde{C}(\Pi, I) \mid \omega(A) = l\}$ і $\mathcal{A}_n = \cup \left\{ \mathcal{A}(l) \mid l \geq \frac{1}{n} \right\}$, $n \in \mathbb{N}$. Легко бачити, що всі \mathcal{A}_n — компакти, і, значить, Z -множини в $\tilde{C}(\Pi, I)$ і $\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \dots$. Покажемо, що множина $\cup \{\mathcal{A}_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ є Z -скелетоїдом в $\tilde{C}(\Pi, I)$ [4]. Зафіксуємо $n \in \mathbb{N}$ і $\varepsilon_0 > 0$. Покладемо

$$h(A) = \begin{cases} h_{e^*}(A) & \text{при } d(A, \mathcal{A}_n) \geq \varepsilon^*, \\ h_e(A) & \text{при } 0 < \varepsilon = d(A, \mathcal{A}_n) < \varepsilon^*, \\ A & \text{при } A \in \mathcal{A}_n, \end{cases}$$

де $\varepsilon^* = \min \left\{ \varepsilon_0, \frac{1}{3n} \right\}$. Розглянемо відображення $h : \tilde{C}(\Pi, I) \rightarrow \mathcal{A}_m$, де $m \geq 2n$. З означення відображення h безпосередньо випливає, що

$$1) h|_{\mathcal{A}_n} = \text{id}_{\mathcal{A}_n} \text{ і } h|\tilde{C}(\Pi, I) \setminus \mathcal{A}_n \subset \mathcal{A}_m \setminus \mathcal{A}_n;$$

2) відображення h є ін'ективним.

Дійсно, досить перевірити властивість (2) для $h|\tilde{C}(\Pi, I) \setminus \mathcal{A}_n$. Розглянемо довільний $C \in h(\tilde{C}(\Pi, I) \setminus \mathcal{A}_n)$ і покажемо, що існує єдине $A \in \tilde{C}(\Pi, I) \setminus \mathcal{A}_n$ таке, що $h(A) = C$.

Нехай підмножина $Y \subset \Pi \times I$ складається з таких відрізків $[(x, y), (x, y + \Delta y)]$, що існує відкрита множина V , для якої $V \cap C = ((x, y), (x, y + \Delta y))$. Оскільки всякий ε -окіл будь-якої множини e об'єднання куль радіуса ε , то множина Y може бути відновлена за допомогою функції $\Phi_{A,e}$. Позначимо через D проекцію множини Y на перший співмножник. Зрозуміло, що $D = D_{B(U_{e/2} H_e(A))} \cap \left\{ x \in \Pi \mid d(x, S_{i_0}) = \frac{\sigma(t)}{4} \left(1 - \frac{1}{2^t}\right), i \in \mathbb{N} \right\}$. Нехай $x \in D$ і $f(x) = \max \{ \Delta y \mid [(x, y), (x, y + \Delta y)] \in Y, y \in I \}$. Тоді $\max \{f(x) \mid x \in D\} = 3/4$ і ми вже знаємо число $\varepsilon = d(A, \mathcal{A}_n)$. Очевидно, що точки $\{x_1, \dots, x_h\}$, для яких максимум функції f досягається, належать множині S_{i_0} , де $\varepsilon \leq \delta/2^{i_0}$. Ми можемо знайти також всі точки $x_A^t : x_A^t = \frac{4}{3} \max \{f(x) \mid d(x, \{x_1, \dots, x_h\}) = \frac{\sigma(t)}{4} \left(1 - \frac{1}{2^t}\right)\}$, оскільки $\sigma(t)$ -окіл при найменні однієї точки x_i попадає в множину $\{q \in D_{B(U_{e/2} H_e(A))} \mid \psi_{A,e}(q) = 1\}$. Знаючи точку (x_A^t) , можна однозначно визначити $A \in \tilde{C}(\Pi, I) \cong Q$. Отже, відображення $h : \tilde{C}(\Pi, I) \rightarrow h(\tilde{C}(\Pi, I))$ біективне. Легко бачити, що відображення h і h^{-1} неперервні. Тому h є гомеоморфізмом. Очевидно, що $d(h, \text{id}_{\tilde{C}(\Pi, I)}) \leq \varepsilon^* < \varepsilon_0$.

Нехай тепер $\mathcal{B} \subset \tilde{C}(\Pi, I)$ — довільна Z -множина. За теоремою 11.1 з [5] гомеоморфізм $h : \mathcal{A}_n \cup B : \mathcal{A}_n \cup \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}_n \cup h(\mathcal{B})$ можна продовжити до автогомеоморфізму $\bar{h} : \tilde{C}(\Pi, I) \rightarrow \tilde{C}(\Pi, I)$ так, щоб $d(\bar{h}, \text{id}_{\tilde{C}(\Pi, I)}) < \varepsilon_0$. При цьому очевидно, що:

$$1) \bar{h}|_{\mathcal{A}_n \cap \mathcal{B}} = h|_{\mathcal{A}_n \cap \mathcal{B}} = \text{id}_{\mathcal{A}_n \cap \mathcal{B}};$$

$$2) \bar{h}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}_m;$$

$$3) d(\bar{h}, \text{id}_{\tilde{C}(\Pi, I)}) < \varepsilon_0, \text{ тобто множина } \mathcal{A} = \bigcup \{\mathcal{A}_n \mid n \in \mathbb{N}\} \text{ є } Z\text{-скелетоїдом.}$$

Твердження теореми випливає тепер з наведеної вище характеристики пари (Q, s) .

Ця теорема дає відповідь на питання, сформульоване В. В. Федорчуком на топологічному семінарі Московського університету.

1. Федорчук В. В., Филиппов В. В. Общая топология. Основные конструкции.— М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988.— 252 с.
2. Федорчук В. В. О метризуемости пополнений функциональных пространств // Simp. VI Tiraspol. Topol. Gen. Apl.— Chisinau, 1991.— P. 86.
3. Fedorchuk V. V. Completions of functional spaces and multivalued mappings // Zb. rad fil. fak. Nisu. Sec. mat.— 1990.— 4.— С. 3—5.
4. Bessaga Cz., Pelczyński A. Selected topics in infinite-dimensional topology.— Warszawa: PWN, 1975.
5. Чепмэн Т. Лекции о Q -многообразиях.— М. : Мир, 1981.— 156 с.
6. Базилевич Л. Е. Пополнение пространства непрерывных функций на континуумах Пеано // Simp. VI Tiraspol. Topol. Gen. Apl.— Chisinau, 1991.— P. 28.
7. Kroonenberg N. S. Characterization of finite-dimensional Z -sets // Proc. Amer. Math. Soc.— 1974.— 43, N 2.— P. 421—427.

Одержано 06.03.92