

УДК 513.83

Л. П. Плахта, канд. фіз.-мат. наук
(Ін-т прикл. проблем механіки і математики АН України, Львів)

Про множини сингулярних точок дій скінчених груп на $(S^n)^k$

Вивчені реалізації цілочислових D_3 -модулів рангу 2 на $(S^n)^k$ для діедральних груп D_3 . Досліджені когомології множин сингулярних точок дій напівпрямих добутків $\mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/q$ та кватерніонних груп Q на $(S^n)^k$.

Изучены реализации целочисленных D_3 -модулей ранга 2 на $(S^n)^k$ для диэдральных групп D_3 . Исследованы когомологии множеств сингулярных точек действий полуправых произведений $\mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/q$ и кватернионных групп Q на $(S^n)^k$.

В ступ. Нехай X — фінітний простір, а G — скінчена група, яка діє на X . Тоді G індукує на градуйованому модулі $H^*(X, \mathbb{Z})$ когомологій структуру G -модуля. Якщо $X \sim (S^n)^k$, тобто X має кільце цілочислових когомологій, ізоморфне кільце $H^*((S^n)^k, \mathbb{Z})$, то $H^*(X, \mathbb{Z})$ утворює зовнішню алгебру з k n -вимірними твірними $\Lambda_{\mathbb{Z}}^*$ (e_1, \dots, e_k). Тоді дія групи G на X індукує на $H^*(X, \mathbb{Z})$ структуру градуйованого G -модуля, яка визначається G -модулем $H^n(X, \mathbb{Z})$ і U -добутком.

З іншого боку, нехай M — скінченнопороджений, без скрутку, рангу k над \mathbb{Z} G -модуль. Виникає наступне питання. Чи існує дія групи G на $(S^n)^k$, яка б індукувала на $H^n((S^n)^k, \mathbb{Z})$ структуру G -модуля, ізоморфного M ? Іншими словами, чи існує реалізація даного G -модуля на $(S^n)^k$? Для цикліческих груп $G = \mathbb{Z}/p$ Адем [1] наводить необхідні умови реалізації цілочислових G -модулів у термінах матриці $T \in SL(k, \mathbb{Z})$, що відповідає твірній групі \mathbb{Z}/p , та її елементарних дільників. У першій частині даної статті ці умови будуть використані для встановлення неможливості реалізації класу цілочислових G -модулів, де $G = D_3$ — діедральна група порядку 6.

Когомологічна структура множини нерухомих точок дій цикліческих груп простого порядку на просторах $X \sim (S^n)^k$ описана в [2]. Адем до-

© Л. П. ПЛАХТА, 1992

сліджував дії циклічної групи простого порядку на $X \sim (S^n)^k$. Нехай F — множина нерухомих точок дії групи \mathbb{Z}/p на $(S^n)^k$. Виявляється, що структура цілочислового \mathbb{Z}/p -модуля $H^n((S^n)^k, \mathbb{Z})$ накладає суттєві обмеження на структуру \mathbb{Z} -модуля $H^n(F, \mathbf{F}_p)$. Зокрема, якщо цілочисловий модуль $H^n(X, \mathbb{Z})$ над $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}p]$, де $X \sim (S^n)^k$, є проективним модулем типу $\bigoplus_{i=1}^l A(a_i)$, то $F \sim p(S^n)^l$, тобто $H^*(F, \mathbf{F}_p) \cong H^*((S^n)^l, \mathbf{F}_p)$ [1]. Деякі співвідношення для когомологій множини нерухомих точок і множини сингулярних точок дії скінченної групи G на $X \sim (S^n)^k$ можна одержати, використовуючи локалізацію градуйованого модуля еквіваріантних когомологій по мультиплікативній множині $S \subseteq H^*(BG)$. В другій частині даної статті одержані співвідношення для когомологій множин сингулярних точок дії напівпрямих добутків $\mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/q$, де p, q — непарні прости числа, $q/p = 1$, а також кватерніонних груп Q , на $X \sim (S^n)^k$.

Ми використовуємо термінологію і позначення робіт [1–3].

1. Наведемо необхідні відомості з теорії цілочислових G -модулів.

Означення 1. Під цілочисловим G -модулем будемо розуміти вільний, скінченнопороджений над \mathbb{Z} модуль над груповим кільцем $\mathbb{Z}G$, де G — скінчenna група. Іншими словами, це скінченнопороджене цілочислове зображення групи G .

Нехай $G = D_p$ — діедральна група порядку $2p$, тобто $D_p = \langle x, y \mid x^p = y^2 = e, yxy = x^{-1} \rangle$ і M — цілочисловий G -модуль.

Означення 2. Будемо говорити, що цілочисловий G -модуль M рангу k над \mathbb{Z} реалізується на $(S^n)^k$, якщо для деякої дії групи G на $(S^n)^k$ індуктований нею цілочисловий G -модуль $H^n((S^n)^k, \mathbb{Z})$ ізоморфний G -модулю M .

Очевидно, що коли D_p -модуль N реалізується на $(S^n)^k$, то реалізується на $(S^n)^k$ і \mathbb{Z}/p -модуль $N_1 = \text{res}_{\mathbb{Z}/p}^{D_p} N$, де \mathbb{Z}/p — нормальна циклична підгрупа групи D_p , породжена елементом x .

Нехай \mathbf{Q} — поле раціональних чисел, θ — первісний корінь p -го степеня з 1 над \mathbf{Q} , p — просте число, $\text{Irr}(\theta, \mathbf{Q}) = 1 + x + \dots + x^{p-1}$, R — кільце цілих алгебраїчних чисел в $K = \mathbf{Q}(\theta)$.

Означення 3. Ідеалом у полі $\mathbf{Q}(\theta)$ називається довільний скінченнопороджений ненульовий R -підмодуль A_i в K .

Відомо, що $\text{rk}_{\mathbb{Z}} A_i = p - 1$ для довільного ідеалу A в K [4]. Задамо дію групи \mathbb{Z}/p на A таким чином: $g \cdot a = \theta a$, $a \in A$, де g — твірна групи \mathbb{Z}/p . Тоді A_i — \mathbb{Z}/p -модуль. Число класів ізоморфних ідеалів A_i скінченнє [4].

Нехай A_i — ідеал в K . Розглянемо групу $A \oplus \mathbb{Z}y$ і зафіксуємо $a_0 \in A$, $a_0 \notin (0 - 1)A$. Задамо дію групи \mathbb{Z}/p на $A \oplus \mathbb{Z}y$:

$$g \cdot a = \theta a, \quad a \in A, \quad g \cdot y = y + a_0.$$

Тоді група $A \oplus \mathbb{Z}y$ перетворюється в \mathbb{Z}/p -модуль, який позначається $A(a_0)$. Зауважимо, що $A(a_0)$ — проективний \mathbb{Z}/p -модуль.

Відомо, що для простих чисел p існують тільки три типи нерозкладних \mathbb{Z}/p -модулів із скінченною базою над \mathbb{Z} : 1) модуль \mathbb{Z} з тривіальною дією групи \mathbb{Z}/p ; 2) ідеал A_i в полі $\mathbf{Q}(\theta)$; 3) проективний модуль типу $A_i(a)$, де $a \notin (0 - 1)A$. Більше того, довільний \mathbb{Z}/p -модуль із скінченною \mathbb{Z} -базою розкладається в пряму суму нерозкладних \mathbb{Z}/p -модулів типів 1, 3 і в певному розумінні однозначно [4]. Маємо $A(a_0) \otimes \mathbf{F}_p \cong \mathbf{F}_p[\mathbb{Z}/p]$.

Нехай $R^* = H^*((S^n)^k, \mathbb{Z})$, де n — парне число, і T : $R^* \rightarrow R^*$ — автоморфізм скінченної періоду p . Адем показав [1], що автоморфізм $T^{(n)}$ можна зобразити знакопереставною матрицею. Більше того, якщо p — просте непарне число, то автоморфізм $T^{(n)}$ у деякій базі можна зобразити матрицею перестановки.

Отже, маємо необхідну умову реалізації автоморфізму $T^{(n)}$ простого періоду p , де $p \neq 2$ і $n = 2k$:

якщо автоморфізм $T^{(n)}$ реалізується на $(S^n)^k$, то в деякій базі він зображується матрицею перестановки елементів бази, всі цикли якої мають довжину 1 або p . (1)

Зауважимо, що група D_3 збігається з симетричною групою $S_3 = \langle e, a, b, ab, b^2, ab^2 \rangle$ з кодом $\langle a, b/a^2 = b^3 = e, ab^2 = ba \rangle$. Цілочислове зображення групи S_3 рангу k однозначно задається парою матриць $A, B \in SL(k, \mathbb{Z})$, що задовольняють умови $A^2 = B^3 = E, AB^2 = BA$, причому $a \rightarrow A, b \rightarrow B$. Всі незвідні цілочислові зображення групи S_3 описані в [5].

Твердження 1. Серед усіх незвідних цілочислових зображень групи D_3 (D_3 -модулів) рангу 2 реалізуються на $(S^n)^k$, де n — парне число, тільки D_3 -модулі типу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Доведення. Усього є три типи незвідних цілочислових зображень групи D_3 рангу 2 [5]:

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; & 2) \quad A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \\ 3) \quad A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Розглянемо зображення групи D_3 типу 1. Нехай $M_1 = \text{res}_{(b)}^{D_3} M$. Отже, зображення M_1 циклічної підгрупи $\langle b \rangle$ групи D_3 задається матрицею $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Характеристичний поліном матриці B дорівнює $(\lambda - 1)^2$, тобто матриця B не задовольняє умову (1). З іншого боку, зображення $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ групи D_3 еквівалентне наступному: $A_1 = T^{-1}AT, B_1 = T^{-1}BT$, де $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. Легко бачити, що дане зображення групи D_3 реалізується на $(S^n)^2$ гомеоморфізмами

$$\tilde{A}: S^n \times S^n \rightarrow S^n \times S^n, \quad \tilde{A}(x, y) = (y, x), \quad \tilde{B} = id: S^n \times S^n \rightarrow S^n \times S^n.$$

Розглянемо зображення групи D_3 типу 2. Нехай $M_1 = \text{res}_{(b)}^{D_3} M$. Характеристичний поліном f матриці B дорівнює $\lambda^2 + \lambda + 1$. Отже, $\mathbb{Z}/3$ -модуль M_1 не реалізується на $(S^n)^k$, де n — парне число, і тому D_3 -модуль M типу 2 не реалізується на $(S^n)^k$ для парних чисел n . Нарешті, цілочислове зображення M групи D_3 типу 3 не реалізується на $(S^n)^k$, де n — парне число. Дійсно, нехай $M_1 = \text{res}_{(b)}^{D_3} M$. Характеристичний поліном f матриці B дорівнює $\lambda^2 + \lambda + 1$ і тому $\mathbb{Z}/3$ -модуль M_1 не реалізується на $(S^n)^k$, $n = 2l$. Отже, не реалізується на $(S^n)^k$, $n = 2l$, і D_3 -модуль M .

2. Нехай G — скінчenna група, а $p: EG \rightarrow BG$ — універсальне головне розшарування. Якщо X — G -простір, а A — його інваріантний підпростір, то через (X_G, A_G) позначатимемо пару просторів $(EG \times_G X, EG \times_G A)$, а через p_G — розшарування з типовим шаром X , $p_X: X_G = EG \times_G X \rightarrow BG$. Далі, нехай $H_G^*(X, A)$ — еквіваріантні когомології пари просторів (X, A) , тобто $H_G^*(X, A) = H^*(X_G, A_G)$. Градуйовану алгебру $H_G^*(X, A)$ можна розглядати як градуйований модуль над градуйованим кільцем $H^*(BG)$, вводячи множення наступним чином. Для $x \in H^*(BG)$ і $y \in H_G^*(X, A)$ покладемо $x \cdot y = p_X^*(x)y$, де \cdot — спарювання $H_G^*(X) \otimes H_G^*(X, A) \rightarrow H_G^*(X, A)$, що визначається U -добрутком [3].

Означення 4. Точку x G -простору X будемо називати сингулярною, якщо її стабілізатор не є тривіальною підгрупою. Через X^G позначимо множину нерухомих точок дії групи G на X .

Нехай p і q — взаємно прості непарні числа, $q | p - 1$, $(\mathbb{Z}/p)^*$ — мультиплікативна група одиниць кільця \mathbb{Z}/p . Ін'ективний гомоморфізм

$\Phi: \mathbb{Z}/q \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/p) = (\mathbb{Z}/p)^*$ задає напівпрямий добуток групи \mathbb{Z}/p в групі \mathbb{Z}/q .

Теорема 1. Нехай p, q — непарні прості числа, $q/p - 1, G = \mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/q$ — напівпрямий добуток групи \mathbb{Z}/p на групу \mathbb{Z}/q , а X — скінченновимірний G -комплекс, $X \sim_p (S^n)^k$, $n \not\equiv -1 \pmod{2q}$ і $k > 0$. Якщо G діє тривіально на когомологіях $H^*(X, \mathbf{F}_p)$, $H^*(X^{\mathbb{Z}/p}, \mathbf{F}_p)$, то має місце ізоморфізм $\mathbb{Z}/2q$ -градуйованих модулів $H^*(X^{\mathbb{Z}/p}, \mathbf{F}_p) \cong H^*(X, \mathbf{F}_p)$.

Доведення. Відомо [3], що $H^*(BG, \mathbf{F}_p) = \mathbf{F}_p[u]$, де $u \in H^{2q}(BG, \mathbf{F}_p)$. Отже, G має періодичні когомології з коефіцієнтами в полі \mathbf{F}_p . Далі, поле \mathbf{F}_p можна розглядати як градуйовану алгебру, всі елементи якої сконцентровані в вимірі 0. Аналогічно $H^*(BG, \mathbf{F}_p)$ утворює $\mathbb{Z}/2q$ -градуйовану алгебру M , всі елементи якої сконцентровані в члені M_i , $i \equiv 0 \pmod{2q}$. Існує очевидний гомоморфізм $t: H^*(BG, \mathbf{F}_p) \rightarrow \mathbf{F}_p$, $\mathbb{Z}/2q$ -градуйованих алгебр, який відображає твірну u кільца поліномів $\mathbf{F}_p[u]$ в $1 \in \mathbf{F}_p$. Відображення t задає на \mathbf{F}_p структуру $H^*(BG, \mathbf{F}_p)$ -модуля.

Розглянемо спектральну послідовність Лере — Серра для розшарування $X_G \rightarrow BG$ з коефіцієнтами в \mathbf{F}_p [2]. Маємо $H^p(BG, H^q(X, \mathbf{F}_p)) \Rightarrow \Rightarrow H^{p+q}(X_G, \mathbf{F}_p)$. Крім того, $E_2^{2tq, 0} \cong \mathbf{F}_p$, $q \geqslant 0$, і $E_2^{r, 0} = 0$ при $r \not\equiv 0 \pmod{2q}$, $E_2^{0, nl} \cong \bigoplus_{l \leqslant k} \binom{l}{k} \mathbf{F}_p$, $l \leqslant k$, і $E_2^{0, l} = 0$ при $j \not\equiv 0 \pmod{n}$ і при $j > nk$. Оскільки G діє тривіально на $H^*(X, \mathbf{F}_p)$, то з теореми про універсалні коефіцієнти [2] випливає $E_2^{2tq, nl} \cong E_2^{2tq, 0} \otimes E_2^{0, nl} \cong \bigoplus_{l \leqslant k} \binom{l}{k} \mathbf{F}_p$, $l \leqslant k$, $t \geqslant 0$, а для всіх інших пар (i, j) $E_2^{i, j} = 0$. У даній спектральній послідовності ненульовими можуть бути лише диференціали d_{sn+1} , $k \geqslant s \geqslant 1$. Але з умов $n \not\equiv -1 \pmod{2q}$, $E_2^{0, sn} = \Lambda^s(l_1, \dots, l_n)$ випливає співвідношення $d_{sn+1}(E_2^{0, sn}) = 0$ при $s \geqslant 0$. Отже, $d_{sn+1}(E_2^{*, *}) = 0$ і дана спектральна послідовність вироджується. Оскільки, крім того, $H^*(X, \mathbf{F}_p)$ — скінченнопороджений, вільний \mathbf{F}_p -модуль, то X цілком негомологічний нулю в X_G і множина елементів $(x_v | v \in J)$, $x_v \in H_G^*(X, \mathbf{F}_p)$ таких, що $(j^*x_v | v \in J)$ утворює \mathbf{F}_p -базу в $H^*(X, \mathbf{F}_p)$, сама є базою $H^*(BG, \mathbf{F}_p)$ -модуля $H_G^*(X, \mathbf{F}_p)$ [3].

Нехай S — мультиплікативна підмножина мономів $\{1, u, u^2, \dots, \}$ кільца поліномів $\mathbf{F}_p[u]$. Гомоморфізм t , очевидно, продовжується до гомоморфізму $\eta: S^{-1}H^*(BG, \mathbf{F}_p) \cong \mathbf{F}_p[u, u^{-1}] \rightarrow \mathbf{F}_p$, оскільки $t(u) = 1$. Це дозволяє розглядати \mathbf{F}_p як $\mathbb{Z}/2q$ -градуйований модуль над $S^{-1}H^*(BG, \mathbf{F}_p)$. Нехай $\mathcal{I}(S) = \{H/S \cap \text{Ker}(H_G^*(G/G, \mathbf{F}_p) \rightarrow H_G^*(G/H, \mathbf{F}_p)) \neq 0\}$, де $H_G^*(G/G, \mathbf{F}_p) \cong H^*(BG, \mathbf{F}_p)$ і $H_G^*(G/H, \mathbf{F}_p) \cong H^*(BH, \mathbf{F}_p)$. Відомо [3], що $\mathcal{I}(S)$ складається з таких підгруп H групи G , для яких існує $s \in S$, що задовільняє умову $s \cdot H_G^*(G/H, \mathbf{F}_p) = 0$, але множення на s є ізоморфізмом $H^j(B\mathbb{Z}/p, \mathbf{F}_p) \rightarrow H^{j+|s|}(B\mathbb{Z}/p, \mathbf{F}_p)$ при $j > 0$ і $H^*(B\mathbb{Z}/q, \mathbf{F}_p) = 0$. Тому $\mathcal{I}(S) = \{0, \mathbb{Z}/q\}$. Внаслідок теореми про локалізацію [3] маємо ізоморфізм $S^{-1}t^*: S^{-1}H_G^*(X, \mathbf{F}_p) \rightarrow S^{-1}H_G^*(X^{\mathbb{Z}/p}, \mathbf{F}_p)$, який індукується включенням $i: X^{\mathbb{Z}/p} \rightarrow X$. Отже, має місце наступний ланцюжок ізоморфізмів $\mathbb{Z}/2q$ -градуйованих модулів:

$$\begin{aligned} H_G^*(X, \mathbf{F}_p) \otimes_{H^*(BG, \mathbf{F}_p)} t^*\mathbf{F}_p &\cong S^{-1}H_G^*(X, \mathbf{F}_p) \otimes_{S^{-1}H^*(BG, \mathbf{F}_p)} \eta\mathbf{F}_p \cong \\ &\cong S^{-1}H_G^*(X^{\mathbb{Z}/p}, \mathbf{F}_p) \otimes_{S^{-1}H^*(BG, \mathbf{F}_p)} \eta\mathbf{F}_p \cong H_G^*(X^{\mathbb{Z}/p}, \mathbf{F}_p) \otimes_{\mathbf{F}_p} S^{-1}H^* \times \\ &\times (BG, \mathbf{F}_p) \otimes_{S^{-1}H^*(BG, \mathbf{F}_p)} \eta\mathbf{F}_p \cong H^*(X^{\mathbb{Z}/p}, \mathbf{F}_p) \otimes_{\mathbf{F}_p} \eta\mathbf{F}_p \cong H^*(X^{\mathbb{Z}/p}, \mathbf{F}_p). \end{aligned}$$

Зауважимо, що модуль $H_G^*(X, \mathbf{F}_p) \otimes_{H^*(BG, \mathbf{F}_p)} \eta\mathbf{F}_p$ ізоморфний модулю Λ^* , породженному елементами $(e_i \otimes 1') \otimes_t 1$, $i = \overline{1, k}$, де e_1, \dots, e_k — твірні вільного \mathbf{F}_p -модуля $H^n((S^n)^k, \mathbf{F}_p)$, $1'$ — одиниця кільца $H^*(BG, \mathbf{F}_p)$ і 1 —

одиниця поля F_p . Якщо на алгебрі Λ^* ввести $\mathbb{Z}/2q$ -градуування, покладаючи $e_i \in \Lambda^{n \bmod 2q}$, $i = \overline{1, k}$, то одержимо ізоморфізм $\mathbb{Z}/2q$ -градуованих модулів.

Нагадаємо, що кватерніонна група $Q(m)$ порядку $4m$ задається наступними твірними і співвідношеннями $\langle x, y/x^m = y^2, y^{-1}xy = x^{-1} \rangle$.

Теорема 2. *Нехай $Q = Q(2^m)$ — кватерніонна група порядку $4 \cdot 2^m$, X — скінченнонімірний Q -комплекс, $X \sim_2 (S^n)^k$, $X^Q \neq \emptyset$ і $x \in X^Q$. Якщо дія групи Q на когомологіях $H^*(X, F_2)$, $H^*(X^{\mathbb{Z}/2}, F_2)$ тривіальна, то має місце ізоморфізм $\mathbb{Z}/4$ -градуованих модулів $H^*(X^{\mathbb{Z}/2}, x, F_2) \cong H^*(X, x, F_2)$.*

Доведення. Нагадаємо, що $H^*(BQ, F_2) = F_2 [u]$, де $u \in H^1(BQ, F_2)$, а всі елементи групи $H^r(BQ, F_2)$, $r \not\equiv 0 \pmod{4}$, нільпотентні [3]. Поле F_2 можна розглядати як $\mathbb{Z}/4$ -градуовану алгебру, всі елементи якої сконцентровані у вимірі 0. Аналогічно кільце $H^*(BQ, F_2)$ можна розглядати як $\mathbb{Z}/4$ -градуовану алгебру над полем F_2 . Означимо гомоморфізм $\mathbb{Z}/4$ -градуованих алгебр $\tau : H^*(BQ, F_2) \rightarrow F_2$, покладаючи $\tau(u) = 1$ і $\tau(x) = 0$ для всіх $x \in H^r(BQ, F_2)$, де $r \not\equiv 0 \pmod{4}$. Відображення τ задає на полі F_2 структуру $H^*(BQ, F_2)$ -модуля. Нехай $S = \{1, u, u^2, \dots\}$. Очевидно, що S — мультиплікативна підмножина кільця $H^*(BQ, F_2)$. Оскільки $\tau(u) = 1$, то існує продовження гомоморфізму τ до гомоморфізму $\mathbb{Z}/4$ -градуованих алгебр $\eta : S^{-1}H^*(BQ, F_2) \rightarrow F_2$, причому $\eta(u^{-1}) = 1$. Гомоморфізм η задає на F_2 структуру $S^{-1}H^*(BQ, F_2)$ -модуля.

Розглянемо спектральну послідовність Лере — Серра для розшарування $(X_G, x_G) \xrightarrow{p} BG$ з коефіцієнтами в F_2 , де $x_G \simeq x \times BG$. Оскільки дія Q на когомологіях $H^*(X, x, F_2)$ тривіальна, то з теореми про універсалні коефіцієнти одержуємо такі співвідношення: $E_2^{t,0} = 0$ для всіх $t \geq 0$, $E_2^{0, nl} \cong \bigoplus_{\binom{t}{k}} F_2$, $E_2^{0,r} = 0$ при $r \not\equiv 0 \pmod{n}$ і при $r > kn$, і $E^{t, nl} \cong H^t(BQ, F_2) \otimes E_2^{0, nl}$, $1 \leq l \leq k$. Оскільки $E_2^{s,p} = 0$ при $p < n$, то $d_{n+1}(E_{n+1}^{s,n}) = d_{n+1}(E_2^{s,n}) = 0$, і з мультиплікативності спектральної послідовності випливає $d_{n+1}(E_{n+1}^{s,n}) = d_{n+1}(E_2^{s,n}) = 0$. Отже, дана спектральна послідовність вироджується, тобто $E_2^{*,*} = E_\infty^{*,*}$. З останнього факту і з тривіальності дії групи Q на когомологіях $H^*(BQ, F_2)$ випливає, що пара (X, x) цілком негомологічна нулью в (X_G, x_G) і модуль $H_G^*(X, x, F_2)$ є вільним $H^*(BQ, F_2)$ -модулем. Подальші міркування аналогічні відповідним викладкам при доведенні теореми 1. Покладемо $\mathcal{T}(S) = \{H/S \cap \text{Ker}(H_Q^*(Q/Q, F_2) \rightarrow H_Q^*(Q/H, F_2)) \neq 0\}$. Множина $\mathcal{T}(S)$ складається з таких підгруп H групи Q , для яких існує $s \in S$, що задовільняє умову $s \cdot H_Q^*(Q/H, F_2) = 0$. Але множення на u є ізоморфізмом $H^r(BH, F_2) \rightarrow H^{r+4}(BH, F_2)$ для довільної нетривіальної підгрупи H групи Q . Тому $\mathcal{T}(S) = \{0\}$. Застосовуючи теорему про локалізацію [3], одержуємо ізоморфізм

$$\begin{aligned} H_Q^*(X, x; F_2) \otimes_{H^*(BQ, F_2), \tau} F_2 &\cong S^{-1}H_Q^*(X, x; F_2) \otimes \\ &\otimes_{S^{-1}H^*(BQ, F_2), \eta} F_2 \cong S^{-1}H_Q^*(X^{\mathbb{Z}/2}, x; F_2) \otimes_{S^{-1}H^*(BQ, F_2), \eta} F_2 \cong \\ &\cong H^*(X^{\mathbb{Z}/2}, x; F_2) \otimes_{F_2} S^{-1}H^*(BQ, F_2) \otimes_{S^{-1}H^*(BQ, F_2), \eta} F_2 \cong \\ &\cong H^*(X^{\mathbb{Z}/2}, x; F_2) \otimes_{F_2} F_2 \cong H^*(X^{\mathbb{Z}/2}, x; F_2). \end{aligned}$$

З іншого боку, $\mathbb{Z}/4$ -градуований модуль $H_G^*(X, x, F_2) \otimes_{H^*(BQ, F_2), \tau} F_2$ ізоморфний $\mathbb{Z}/4$ -градуованому модулю $M = H^*(X, x; F_2)$, якщо покласти $M_i = \bigoplus_{r \geq 0} H^{4r+i}(X, x; F_2)$ $i = \overline{0, 3}$. З останнього зауваження і з наявності ізоморфізму $\mathbb{Z}/4$ -градуованих модулів $H_Q^*(X, x; F_2) \otimes_{H^*(BQ, F_2), \tau} F_2 \cong H^*(X^{\mathbb{Z}/2}, x; F_2)$ випливає твердження теореми.

З ауваження 1. Якщо X — скінченновимірний G -комплекс, $G = \mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/q$, $X \sim_p (S^n)^k$ і $X^G \neq \emptyset$, то справедливий аналог теореми 2.

З ауваження 2. Нехай M — скінчений G -модуль. Позначимо через $\exp M$ таке найменше додатне число $n \in \mathbb{Z}$, для якого $nx = 0$ при всіх $x \in M$. Далі, нехай C — вільний зв'язний ланцюговий G -комплекс скінченої довжини. Браудер [6] показав, що тоді $|G|$ ділить $w = \prod_{j \geq 1} \exp H^j(G, H_j(C))$.

Звідки випливає наступне твердження.

Твердження 2. Якщо кватерніонна група Q , $Q = Q(2^m)$, діє вільно і клітково на скінченновимірному CW-комплексі X , де $H_*(X, \mathbb{Z}) \cong \cong H_*((S^n)^k, \mathbb{Z})$, з тривіальною дією в гомологіях $H_*(X, \mathbb{Z})$, то n — непарне. Крім того, якщо $n \equiv 1 \pmod{4}$, то $k \geq 3$.

Доведення. Маємо $H_{nl}(X, \mathbb{Z}) \cong \bigoplus_{\binom{l}{k}} \mathbb{Z}$ і $H_t(X, \mathbb{Z}) = 0$ при $t \not\equiv 0 \pmod{n}$. Оскільки $\bigoplus_{\binom{l}{k}} \mathbb{Z}$ — пряма сума тривільних модулів \mathbb{Z} , то одержимо $H^{nl+1}(Q, \bigoplus_{\binom{l}{k}} \mathbb{Z}) = \bigoplus_{\binom{l}{k}} H^{nl+1}(Q, \mathbb{Z})$ і $\exp H^{nl+1}(Q, \bigoplus_{\binom{l}{k}} \mathbb{Z}) = \exp H^{nl+1}(Q, \mathbb{Z})$. Для $t \not\equiv 1 \pmod{n}$ маємо $\exp H^t(Q, H_{t-1}(X, \mathbb{Z})) = 1$. Принуємо, що n — парне. Тоді $H^{nl+1}(Q, \mathbb{Z}) = 0$ і $\exp H^{nl+1}(Q, \mathbb{Z}) = 1$. Отже, $w = \prod_{j \geq 1} \exp H^{j+1}(Q, H_j(X, \mathbb{Z})) = 1$ і $|Q|$ не ділить w . Ми отри-

мали суперечність. Якщо $n \equiv 1 \pmod{4}$ і $k \leq 2$, то $\exp H^{n+1}(Q, H_n(X, \mathbb{Z})) = 2$, $\exp H^{2n+1}(Q, H_{2n}(X, \mathbb{Z})) = 1$ і ми знов отримали суперечність, оскільки $|Q| = 4 \cdot 2^m$ не ділить числа w .

З ауваження 3. В теоремі 2 множина $X^{\mathbb{Z}/2}$ збігається з множиною сингулярних точок дії групи Q на X , а в теоремі 1 множина $X^{\mathbb{Z}/p}$ є підмножиною множини сингулярних точок $X^{\mathbb{Z}/p} \cup X^{\mathbb{Z}/q}$ дії групи $G = \mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/q$ на X .

1. **Adem A.** $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ actions on $(S^n)^k$ // Trans. Amer. Math. Soc.— 1987.— 300, N 2.— P. 719—809.
2. **Бредон Г.** Введение в теорию компактных групп преобразований.— М.: Наука, 1980.— 440 с.
3. **Tanitomo tom Dieck.** Transformation groups.— Berlin; New York: de Gruyter, 1987.— 312 p.
4. **Кэртас Ч., Райнер И.** Теория представлений конечных групп и ассоциативных алгебр.— М.: Наука, 1969.— 668 с.
5. **Назарова Л. А., Ройтер А. В.** Целочисленные представления симметрической группы третьей степени // Укр. мат. журн.— 1962.— 14, № 3.— С. 271—278.
6. **Brauer W.** Cohomology and group actions // Invent. math.— 1983.— 71, N 3.— P. 599—607.

Одержано 06.03.92